

FFP2-maskers voor zorgverleners

Nieuwe varianten van COVID-19 kunnen mogelijk veel besmettelijker zijn dan het klassieke virus. Van nieuwe varianten is er vaak geen sluitend bewijs dat chirurgische IIR-maskers voldoende zijn. Het is daarom nodig om uit voorzorg FFP2-maskers in te zetten ter bescherming van zorgverleners.

Zorgverleners gebruiken altijd een mondneusmasker

TYPE FFP2



1. Draag een mondneusmasker type FFP2:

- Patiënten met (een verdenking van) covid-19; en/of
- Hoog-risicosituatie¹; en/of
- Een gevoel van onveiligheid bij het dragen van een ander type neusmondmasker.

TYPE IIR



2. Draag een mondneusmasker type IIR bij:

- Alle overige situaties.

Wijk van de bovenstaande maatregelen af als je dat professioneel nodig en verantwoord vindt.

Overige infectiepreventiemaatregelen

Zorg dat je ook de andere maatregelen in acht neemt:

- Handhygiëne;
- Spatbril, schort met lange mouwen en wegwerphandschoenen bij patiënten met covid-19 (of verdenking);
- Correct gebruik van PBM;
- Anderhalve meter afstand tijdens pauzes en zo mogelijk tijdens het werk;
- Bij klachten thuisblijven en je laten testen.
- Ventilatie van ruimten;
- Reiniging en desinfectie;
- Inrichting van ruimten.

Zorgverleners moeten altijd vrijelijk over voldoende PBM kunnen beschikken.

Knelpunten? Meld ze bij:

[Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd](#), [Inspectie SZW](#), [V&VN Meldpunt](#)

¹1. Langdurig binnen de anderhalve meter werken, 2. Werken in onvoorspelbare situaties, waarbij niet vooraf kan worden vastgesteld of een patiënt mogelijk besmet is met het coronavirus en 3. Werken met patiënten die de hygiënemaatregelen niet in acht (kunnen) nemen en die hun klachten niet goed kunnen uiten.